























様へ

説明医師




















説明看護師(外来)

看護師(病棟)

月日	月 日	月 日	月 日
経過	当日(術前)	当日(術後)	術後1日目 術後2日目
目標	心身ともに安定した状態で手術を受けられる	創部の出血・感染がない	感染徴候がない 汎発性腹膜炎の徴候がない PEGの手技が習得できる
検査			 血液検査を行います
食事	 飲水が可能であれば午前9時まで透明な水分は可能	 飲水が可能であれば手術2時間後より水分のみ可能	朝より胃ろうから白湯の注入を開始(200ml×3)
処置・観察	 体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測定します リストバンドを装着します(退院日まで装着します)	 消化器センターで手術を行います	 1本のみ抜糸します 医師が毎日、創部を洗浄します
点滴・内服	 持参薬、お薬手帳を看護師にお渡しください  中止薬以外の朝のお薬は7時半までに内服してください  入室前に点滴を行います	 引き続き点滴があります  夕方より必要時内服・注射があります	 翌朝まで点滴を行います   点滴を朝、夕を行います
行動	 以下の手術準備を行います ・手術着に着替える ・入れ歯、時計、アクセサリー等の取り外し	 術後2時間よりトイレのみ歩行可能です	 病棟内の歩行ができます 手術着から寝巻きに着替えます
説明	 医師より説明 ・治療計画について  看護師より説明 ・入院生活について  薬剤師より説明 ・持参薬確認 ・内服薬について	 医師より説明 ・手術の経過について	(術後1日目~7日目までに)  看護師より説明・指導 ・PEGケアハンドブックを用いて指導

*** 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください**

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。
 * この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。

月日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
経過	術後 3 日目	術後 4 日目	術後 5 日目	術後 6 日目	退院日
目標	出血がない 穿孔の徴候がない PEG の手技が習得できる 在宅必要物品について管理方法が理解できる				
検査					
食事	医師の指示により注入食が開始				朝食後退院
処置・観察	 体温・脈拍・血圧 酸素飽和度を 測定します 医師が毎日創部を 洗浄します				 残り 3 本 全抜糸します 退院時に リストバンドを 外します
点滴・内服	 術後 3 日目で 点滴終了です  必要時、内服・ 注射があります	 	 	 	 退院処方 があります
行動	 シャワー できます (週 3 回、病棟毎に 異なります)		 院内歩行 できます		
説明	(術後 4 日目～6 日目までに)  医師より説明 ・退院後の治療計画、 療養上の留意点について				 看護師より説明 ・退院後の療養 生活について ・次回交換日について
	(術後 1 日目～7 日目までに)  看護師より説明・指導 ・PEG ケアハンドブックを用いて指導				