

様へ

看護師

月日	月 日	月 日	月 日
経過	入院日	2 日目	3 日目以降
目標	○血が止まりにくくなる薬を中止する必要性を理解できる ○出血傾向なく治療を継続できる ○ヘパリンを24時間投与する必要性を理解できる		
検査	必要な検査は終了しています	血液検査があります 	血液検査があります 
食事	朝食は自宅で  	  	  
処置	体温・脈拍・血圧を測定します 		
	リストバンドを装着します		
注射・内服	ヘパリン（中止する飲み薬の代わりに血液をサラサラにする薬）を24時間持続点滴します  いつも飲んでる薬がある場合は看護師に渡してください  治療前中止薬（有・無） 月 日より を休薬 月 日より を休薬 月 日より を休薬	毎日採血し、血液のサラサラ度を確認しながらヘパリンの投与量を調整します	毎日採血し、血液のサラサラ度を確認しながらヘパリンの投与量を調整します
	制限はありません 	主治医の許可があればシャワーできます 	主治医の許可があればシャワーできます 
説明	医師より説明 手術について 		医師より説明 今後の入院生活及び手術について 
	看護師より説明 入院生活について 		
	薬剤師より説明 内服薬について 		入院を継続して手術に向けて準備します 

* 入院に際してこの用紙を必ずお持ちください。

* 入院に関して心配事がありましたらお申し出ください。

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。また、定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともありますので、予めご承知ください。

京都第一赤十字病院

08-Z92-1

2020.8.3 版