

様へ

説明医師

説明看護師(外来)

看護師(病棟)

月日	月 日	月 日	月 日
経過	入院日	2日目	3日目
目標	確実に内服することができる 不安を伝えることができる 安全に療養することができる		全身状態が安定して内服を続けることができる 安心、安全に検査、治療を受けることができる
検査	 血液検査  心臓超音波検査		 心臓超音波検査
食事	 制限はありません 通常通りの授乳・食事がかまいません 		
処置・観察	ネームバンドを装着します (退院日まで装着します)   体温・脈拍・血圧・呼吸数 酸素飽和度を測定します  留置針を挿入します	心電図モニターを装着します (稀に血糖値が低下し心臓の動きが悪くなるため)   内服前と1時間後、2時間後に 体温・脈拍・血圧・呼吸数・酸素飽和度・血糖を測定します	
点滴・内服	 持参薬、お薬手帳を 看護師にお渡しください   ヘマンジオルシロップを 内服時間にお渡しします 看護師が内服の介助を行います 2日毎に増量します	 1日2回、内服があります 内服の間隔は9時間以上あけてください  哺乳不良時、または嘔吐時は内服せずに 看護師にお知らせください  副作用(血糖値の低下、脈が遅くなる、血圧が下がる)が 出現した際は、減量、もしくは内服を中止することがあります	
行動	制限はありません  沐浴、またはシャワー浴できます 		
説明	 医師より説明 ・入院治療計画について   看護師より説明 ・入院生活について   薬剤師より説明 ・ヘマンジオルシロップの 内服について		
<div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px;">             ※お子様から離れられる時は、必ずベッド柵を最上段まで上げ、転倒・転落事故にご注意ください           </div>			

**\* 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください**

\* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

\* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。

月日	月 日	月 日	月 日	月 日
経過	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目(退院日)
目標	副作用の出現がなく、内服増量できる 不安を伝えることができる			副作用なく退院できる
検査		 心臓超音波検査		 血液検査  心臓超音波検査
食事	 制限はありません 通常通りの授乳・食事がかまいません 			
処置・観察	 内服前と1時間後、2時間後に 体温・脈拍・血圧・呼吸数・酸素飽和度・血糖を測定します			退院時にネームバンドを外します
点滴・内服	 1日2回、内服があります 内服の間隔は9時間以上あけてください  哺乳不良時、または嘔吐時は内服せずに 看護師にお知らせください  副作用(血糖値の低下、脈が遅くなる、 血圧が下がる)が出現した際は、 減量、もしくは内服を中止することがあります		 保護者の方に管理を お願いします	 点滴の針を抜きます
行動	制限はありません  沐浴、またはシャワー浴できます 			
説明				 医師より説明 ・退院後の 治療予定について   看護師より説明 ・退院後の 療養について
※お子様から離れられる時は、必ずベッド柵を最上段まで上げ、転倒・転落事故にご注意ください				