

IgA 腎症 ステロイドパルス療法 (17日間3週間コース)を受けられる

説明医師

説明看護師(外来)

看護師(病棟)

様へ

月日	月 日～ 月 日	月 日～ 月 日	月 日～ 月 日	月 日～ 月 日	月 日～ 月 日	月 日
経過	入院日～3日目	4日～7日目	8日～10日目	11日～14日目	15日～16日目	退院日
目標	○ステロイド副作用症状(不眠・胃腸障害・骨粗しょう症・高低血糖)の出現が最小限にとどめられる ○ステロイド剤服用中の注意点が述べられる ○感染予防行動がとれる					
検査	適宜採血(血糖測定)・尿検査をおこないます 安静時心電図・胸部レントゲンをおこないます 骨密度検査をおこないます					
食事	朝食は自宅                 					
処置・観察	治療のため点滴の針を留置します		治療のため点滴の針を留置します		治療のため点滴の針を留置します	点滴が終了したら針を抜きます。(その後退院となります)退院時にリストバンドを外します
注射	いつも服用しているお薬のある方は確認しますので看護師にお渡しください  ステロイド剤の点滴注射を3日間実施します(1回4時間で投与します) 3日目の点滴が終了後点滴の針を抜きます	ステロイド剤を4日間服用していただきます(朝食後に服用していただきます) ※ステロイド剤に関しては看護師が毎朝配薬します 副作用を予防するために胃薬・骨粗しょう症予防薬などを服用することがあります	ステロイド剤の点滴注射を3日間実施します(1回4時間で投与します)  3日目の点滴が終了後点滴の針を抜きます	ステロイド剤を4日間服用していただきます(朝食後に服用していただきます) ※ステロイド剤に関しては看護師が毎朝配薬します 副作用を予防するために胃薬・骨粗しょう症予防薬などを服用することがあります	ステロイド剤の点滴注射を3日間実施します(1回4時間で投与します) 	退院翌日よりステロイド剤を4日間服用していただきます(朝食後に服用していただきます) その後は次回受診日まで隔日に服用してください
行動	特に制限はありません シャワー浴できます   					
説明	医師より説明 治療について  看護師より説明 入院生活について  薬剤師より説明 薬について 	看護師より説明 薬の副作用について 血糖測定について 感染予防対策について 				医師・看護師より説明 退院後の療養生活について  

* 入院に際してこの用紙を必ずお持ちください。

29-N02-1

* 入院に関して心配事がありましたらお申し出ください。

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。また、定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、

2019.10.3版

予定通りではないこともありますので、予めご承知ください。

京都第一赤十字病院