

ネフローゼ症候群リツキサン療法を受けられる

説明医師

P 1 / 1

様へ

外来看護師
病棟看護師

月日	月 日		月 日	
経過	入院日		退院日	
目標	治療による副作用症状を理解できる 副作用が最小限で治療を終了することができる 感染予防の自己対策が理解でき実施できる 日常生活上の注意点について理解できる			
検査	採血・尿検査をおこないます			
食事	朝食は自宅で			
処置・観察	リストバンドを装着します 点滴の針を留置します 体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測定します ※リツキサン投与開始直後は、薬剤に対する過敏反応が出現する可能性があるため 30 分毎に体温・脈拍・血圧測定や点滴挿入部の観察をします 尿量測定を開始します		退院時にリストバンドを外します 副作用症状がなければ点滴の針を抜きます 朝、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度・体重を測定します 8 時で尿量測定を中止します	
注射・内服	いつも服用しているお薬のある方は看護師に渡してください 入院後も継続していただきます リツキサン投与 30 分前に服用する薬があります（看護師がお渡しします） 点滴を開始します ①生理食塩水 500ml（5 時間） ②側管からステロイド剤 100ml 30 分 ③②が終了したらリツキサン投与（5 時間） ※リツキサン開始 1 時間は、ゆっくり投与し副作用症状の出現がなければ投与速度をあげます		常用薬は継続していただきます	
行動	制限はありません ※感染予防策（手洗い・マスクの着用）を行っていただきます シャワー浴できます			
説明	医師より説明 治療計画について 看護師より説明 入院生活について 治いて療時の注意点について 尿量測定について 薬剤師より説明 薬について		医師より説明 退院後について 看護師より説明 次回受診日について 日常生活上の注意点について	

- * 入院に際してこの用紙を必ずお持ちください。
- * 入院に関して心配事がありましたらお申し出ください。
- * 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。また、定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。
- * この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともありますので、予めご承知ください。

29-N04-1