

様へ

説明医師

説明看護師(外来)

看護師(病棟)

月日	月 日		月 日		月 日	
経過	治療当日(治療前)		治療当日(治療後)		入院2日目	
目標	治療に対する不安を表出できる		副作用が最小限で治療を終了することができる 感染予防の自己対策が理解でき実施できる 心身ともに安定した状態でドセタキセル療法を受けることができる			
検査	身長、体重を測ります 外来で採血結果、体調確認を行ない、入院を決定します					
食事	制限はありません		(入院2日目~3日目) 朝食後、退院となります			
処置	朝食は自宅で					
注射・内服	体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります  リストバンドを装着します(退院日まで装着します)		点滴前に留置針を挿入します  以下の点滴を行います(約2時間半) 1) 制吐剤 2) ドセタキセル 3) 生理食塩液  副作用を低減するための内服薬を開始します		  点滴を1本行います  退院時にリストバンドを外します    退院後37.5℃以上の発熱があった場合には抗生剤の内服を開始します(毎食後1錠ずつ服用)  解熱しても3日分飲み切ってください 高熱が2日以上続く時は外来受診してください	
行動	制限ありません  シャワーできます		化学療法室の説明があります(化学療法初回のみ)			
説明	医師より説明(外来または入院時) 化学療法について  看護師より説明 入院生活について  薬剤師より説明 持参薬確認 使用薬剤について		(入院2日目~3日目) 医師より説明 退院後について  看護師より説明 日常生活の注意点について			

\* 入院に際してこの用紙を必ずお持ちください。

\* 入院に関して心配事がありましたらお申し出ください。

\* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。また、定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

\* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともありますので、予めご承知ください。

35-Z51-3