

レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考
フルオロウラシル+シスプラチン(5FU+CDDP)	14	フルオロウラシル シスプラチン	500 10-20	mg/body day1 mg/body day1	
フルオロウラシル+シスプラチン持続動注療法(5FU+CDDP)	7	フルオロウラシル シスプラチン	500 10-20	mg/body day1 mg/body day1	
Low-dose FP動注	28	フルオロウラシル シスプラチン	1,000-1,250 10	mg/body day1 mg/body day1-5	
フルオロウラシル+マイトマイシン+スフェレックス療法(5FU+MMC)	14	フルオロウラシル マイトマイシン	500 40	mg/body day1 mg/body day1	スフェレックスで溶解
エビルピシン+マイトマイシン+スフェレックス療法(Epi+MMC)	14	エビルピシン マイトマイシン	40 4	mg/body day1 mg/body day1	スフェレックスで溶解
エビルピシン(Epi)	28	エビルピシン	100	mg/body day1	
サイラムザ(ラムシルマブ：RAM)	14	サイラムザ	8	mg/kg day1	
テセントリク+アバスチン(アテゾリズマブ+ベバシズマブ：アテゾリズマブ+Bev)	21	テセントリク アバスチン	1,200 15	mg/body day1 mg/kg day1	
Low doseFP動注(フルオロウラシル+シスプラチン：5FU+CDDP)	28	フルオロウラシル シスプラチン	1,000-1,250 10	mg/body day1-5 mg/body day1-5	96hr持続 one shot道注
イジユド+イミフィンジ(1コース目)(トレメリムマブ+デュルバルマブ)	28	イジユド イミフィンジ	300 1,500	mg/body day1 mg/body day1	
イジユド+イミフィンジ(2コース目以降 イミフィンジのみ)(トレメリムマブ+デュルバルマブ)	28	イミフィンジ	1,500	mg/body day1	
ネクサバル(ソラフェニブ)		ネクサバル	1日2回 ソラフェニブとして1回400mg経口投与. 患者の状態により適宜減量.	連日	
レンビマ(レンパチニブ)		レンビマ	1日1回 体重にあわせてレンパチニブとして体重60kg以上の場合は12mg, 体重60kg未満の場合は8mgを経口投与. 患者の状態により適宜減量.	連日	
スチバーガ(レゴラフェニブ)	28	スチバーガ	1日1回 レゴラフェニブとして160mgを食後に3週間連日経口投与, その後1週間休薬. 患者の状態により適宜減量.	day1-21	
カボメティクス(カボザンチニブ)		カボメティクス	1日1回 カボザンチニブとして60mgを空腹時に経口投与. 患者の状態により適宜減量.	連日	
ゾレドロン酸	21-28	ゾレドロン酸	ゾレドロン酸として4mg/body CCr>60:4mg, CCr50-60:3.5mg, CCr40-49:3.3mg, CCr30-39:3mg		
ランマーク	28	ランマーク	デノスマブとして120mg		