

病名	レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考
消化器 (NEC)	エトボシド+カルボプラチン (NEC) (ETP+CBDCA)	28	エトボシド カルボプラチン	80-100 AUC5	mg/m2 day1-3 day1	
消化器 (NEC)	イリノテカン+シスプラチン(NEC) (CPT-11+CDDP)	28	イリノテカン シスプラチン	60 60	mg/m2 mg/m2	day1,8,15 day1
消化器 (NEC)	ドセタキセル+シスプラチン(NEC) (DOC+CDDP)	28	ドセタキセル シスプラチン	60 80	mg/m2 mg/m2	day1 day1
消化器 (NEC)	エトボシド+シスプラチン(NEC) (ETP+CDDP)	28	エトボシド シスプラチン	100 80	mg/m2 mg/m2	day1,2,3 day1
消化器 (NEC)	アムルピシン(3日連続投与)	21-28	カルセド	45	mg/m2	day1,2,3
消化器 (GIST)	アフィニトール(エベロリムス)		アフィニトール	1日1回 エベロリムスとして1回10mgを経口投与.患者の状態により適宜減量.		連日
消化器 (GIST)	イマチニブ		イマチニブ	1日1回 イマチニブとして1回400mgを食後に経口投与. 年齢・症状により適宜減量.		連日
消化器 (GIST)	スニチニブ	42	スニチニブ	1日1回 スニチニブとして1回50mgを4週間経口投与, その後2週間休薬. 患者の状態により適宜減量		day1-28
消化器 (GIST)	レゴラフェニブ	28	スチバーガ	1日1回 レゴラフェニブとして1回160mgを食後に3週間経口投与し, その後1週間休薬.患者の状態により適宜減量		day1-21
消化器 (GIST)	ゾレドロン酸	21-28	ゾレドロン酸	ゾレドロン酸として4mg/body CCr>60:4mg, CCr50-60:3.5mg, CCr40-49:3.3mg, CCr30-39:3mg		day1
	ランマーク	28	ランマーク	デノスマブとして120mg		day1