

レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考
アフィニートル(エベロリムス)		エベロリムス	1日1回エベロリムスとして10mgを経口投与.患者の状態により適宜減量.	連日	
イムネース(テセロイキン)		イムネース	70	万単位/body day1	1週間に2回投与
テムシロリムス	7	トーリセル	25	mg/body day1	
アキシチニブ		インライタ	1日2回アキシチニブとして1回5mg経口投与.患者の状態により適宜増減するが, 1回10mg1日2回まで増量できる	連日	
スニチニブ	42	スニチニブ	1日1回スニチニブとして1回50mgを4週間連日経口投与し,その後2週間休業.患 者の状態により適宜減量	day1-28	
ソラフェニブ		ソラフェニブ	1日2回ソラフェニブとして1回400mg経口投与.患者の状態により適宜減量	連日	
バゾバニブ		ヴォトリエント	1日1回バゾバニブとして1回800mgを経口投与.患者の状態により適宜減量	連日	
カボザンチニブ		カボメティクス	1日1回カボザンチニブとして1回60mgを経口投与.患者の状態により適宜減量	連日	
オブジーボ+ヤーボイ (ニボルマブ+イピリムマブ:Nivo+Ipi)	21	オブジーボ ヤーボイ	240 1	mg/body mg/kg day1	max4サイクル→オブジーボ単剤療法へ
オブジーボ(2週間毎)(ニボルマブ:Nivo)	14	オブジーボ	240	mg/body day1	オブジーボ+ヤーボイ併用療法4サイクル後
オブジーボ(4週間毎)(ニボルマブ:Nivo)	28	オブジーボ	480	mg/body day1	オブジーボ+ヤーボイ併用療法4サイクル後
オブジーボ(2週間毎)+カボメティクス (ニボルマブ(Nivo)+カボザンチニブ)	14	オブジーボ カボメティクス	240 1日1回 カボザンチニブとして1回40mgを空腹時に経口投与.患者の状態により 適宜減量	mg/body day1 連日	
オブジーボ(4週間毎)+カボメティクス (ニボルマブ(Nivo)+カボザンチニブ)	28	オブジーボ カボメティクス	480 1日1回 カボザンチニブとして1回40mgを空腹時に経口投与.患者の状態により 適宜減量	mg/body day1 連日	
バベンチオ+インライタ (アベルマブ+アキシチニブ)	14	バベンチオ インライタ	10 1日2回 アキシチニブとして1回5mg経口投与.患者の状態により適宜増減するが, 1回10mg1日2回まで増量できる	mg/kg day1 連日	
キイトルーダ(3週間毎)+インライタ (ペムプロリズマブ(Pemb)+アキシチニブ)	21	キイトルーダ インライタ	200 1日2回 アキシチニブとして1回5mg経口投与.患者の状態により適宜増減するが, 1回10mg1日2回まで増量できる	mg/body day1 連日	
キイトルーダ(6週間毎)+インライタ (ペムプロリズマブ(Pemb)+アキシチニブ)	42	キイトルーダ インライタ	400 1日2回 アキシチニブとして1回5mg経口投与.患者の状態により適宜増減するが, 1回10mg1日2回まで増量できる	mg/body day1 連日	
キイトルーダ(3週間毎)+レンピマ (ペムプロリズマブ+レンパチニブ:Pemb+Len)	21	キイトルーダ レンピマ	200 1日1回 レンパチニブとして20mgを経口投与.患者の状態により適宜減量.	mg/body day1 連日	
キイトルーダ(6週間毎)+レンピマ (ペムプロリズマブ+レンパチニブ:Pemb+Len)	42	キイトルーダ レンピマ	400 1日1回 レンパチニブとして20mgを経口投与.患者の状態により適宜減量.	mg/body day1 連日	
キイトルーダ(3週間毎)腎癌術後補助(ペムプロリズマブ:Pemb)	21	キイトルーダ	200	mg/body day1	max12ヶ月
キイトルーダ(6週間毎)腎癌術後補助(ペムプロリズマブ:Pemb)	42	キイトルーダ	400	mg/body day1	max12ヶ月