

病名	レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考
脳腫瘍	テモゾロミド+RT(初発)(TMZ+RT)	70	テモゾロミド 放射線	75 mg/m2	day1-42	
	テモゾロミド維持(初発)(TMZ)	28	テモゾロミド	1サイクル目150mg/m2, 2サイクル目200mg/m2に増量可	day1-5	max12-24サイクル
	テモゾロミド(再発)(TMZ)	28	テモゾロミド	1サイクル目150mg/m2, 2サイクル目200mg/m2に増量可	day1-5	
	ペバシズマブ(2週間毎)(Bev)	14	ペバシズマブ	10 mg/kg	day1	初発はRTおよびTMZ併用
	ペバシズマブ(3週間毎)(Bev)	21	ペバシズマブ	15 mg/kg	day1	初発はRTおよびTMZ併用
骨軟部腫瘍	ドキシソルピシン(ADR)	21	ドキシソルピシン	60 mg/m2	day1	
	エリブリン	21	ハラヴェン	1.4 mg/m2	day1,8	
	トラベクテジン	21	ヨンデリス	1.2 mg/m2	day1,2	
	バゾパニブ		ヴォトリエント	1日1回 バゾパニブとして1回800mgを食事の1時間以上前または食後2時間以降に経口投与.患者の状態により適宜減量	連日	
原発不明癌	TC(パクリタキセル+カルボプラチン: PTX+CBDCA)	21	パクリタキセル カルボプラチン	175 AUC5-6	day1 day1	max6サイクル
	オブジーボ(2週間毎)(ニボルマブ: Nivo)	14	オブジーボ	240 mg/body	day1	
	オブジーボ(4週間毎)(ニボルマブ: Nivo)	28	オブジーボ	480 mg/body	day1	
MSI-High固形癌	キイトルーダ(3週間毎)(ペムプロリズマブ: Pemb)	21	キイトルーダ	200 mg/body	day1	
	キイトルーダ(6週間毎)(ペムプロリズマブ: Pemb)	42	キイトルーダ	400 mg/body	day1	
TMB-High 固形癌	キイトルーダ(3週間毎)(ペムプロリズマブ: Pemb)	21	キイトルーダ	200 mg/body	day1	
	キイトルーダ(6週間毎)(ペムプロリズマブ: Pemb)	42	キイトルーダ	400 mg/body	day1	