

| レジメン名称 | 1サイクル(日) | 薬品名 | 投与量 | 投与日 | 備考 |
|--------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| オブジーボ(2週間毎)(ニボルマブ：Nivo) | 14 | オブジーボ | 240 | mg/body day1 | |
| オブジーボ(4週間毎)(ニボルマブ：Nivo) | 28 | オブジーボ | 480 | mg/body day1 | |
| オブジーボ+ヤーボイ (ニボルマブ+イピリムマブ：Nivo+Ipi) | 21 | オブジーボ | 80 | mg/body day1 | 4サイクル後、オブジーボ単剤 |
| | | ヤーボイ | 3 | mg/kg day1 | |
| キイトルーダ(3週間毎)(ベムプロリズマブ：Pemb) | 21 | キイトルーダ | 200 | mg/body day1 | |
| キイトルーダ(6週間毎)(ベムプロリズマブ：Pemb) | 42 | キイトルーダ | 400 | mg/body day1 | |
| ダブラフェニブ+トラメチニブ | | タフィンラー | 1日2回 ダブラフェニブとして1回150mgを空腹時に経口投与.患者の状態により適宜減量 | 連日 | |
| | | メキニスト | 1日1回 トラメチニブとして1回2mgを空腹時に経口投与.患者の状態により適宜減量 | 連日 | |
| エンコラフェニブ+ピニメチニブ | | ピラフトビ | 1日1回 エンコラフェニブとして1回450mgを経口投与.患者の状態により適宜減量 | 連日 | |
| | | メクトビ | 1日2回 ピニメチニブとして1回45mgを経口投与.患者の状態により適宜減量 | 連日 | |
| ベムラフェニブ | | ゼルボラフ | 1日2回 ベムラフェニブとして1回960mgを経口投与 | 連日 | |
| Low-doseFP療法 (フルオロウラシル+シスプラチン：5FU+CDDP) | 28 | フルオロウラシル | 500 | mg/m2 day1-5 | |
| | | シスプラチン | 5 | mg/m2 day1-5 | |
| パクリタキセル(PTX) | 28 | パクリタキセル | 80 | mg/m2 day1,8,15 | 血管肉腫 |
| ゾレドロン酸 | 21-28 | ゾレドロン酸 | ゾレドロン酸として4mg/body CCr>60:4mg, CCr50-60:3.5mg, CCr40-49:3.3mg, CCr30-39:3mg | day1 | |
| ランマーク | 28 | ランマーク | デノスマブとして120mg/body | day1 | |